

# **AVALIAÇÃO DA FUNCIONALIDADE, INCAPACIDADE E SAÚDE EM PACIENTES COM CÂNCER DE CABEÇA E PESCOÇO (APOIO UNIP)**

**Aluna:** Allini Mafra da Costa

**Orientadora:** Profa. Daniele Alcalá Pompeo

**Curso:** Enfermagem

**Campus:** São José do Rio Preto

O objetivo desta pesquisa foi comparar a funcionalidade em pacientes acometidos com câncer de cabeça e pescoço, segundo a localização do tumor com base em uma versão resumida da Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF), específica para câncer de cabeça e pescoço, contendo 113 categorias. Este foi um estudo transversal, realizado no Hospital de Câncer de Barretos, com pacientes acima de 18 anos e que tenham terminado o tratamento há pelo menos um ano, e sem presença de doença ativa no momento da entrevista. A localização do tumor foi agrupada em Cavidade oral/Orofaringe e Laringe/Hipofaringe. A comparação entre as localidades foi realizada pelo teste de Qui-quadrado ou Teste Exato de Fisher. Para todo o estudo foi considerado um nível de significância de 0,05. Vinte e cinco pacientes (38,5%) foram diagnosticados com tumor na Cavidade oral/Orofaringe, e quarenta (61,5%) na Laringe/Hipofaringe. A idade mediana dos pacientes no momento da entrevista foi de 61 anos, variando de 37 a 92 anos. A maioria das categorias da CIF (100/113, 88,5%) não mostrou diferenças entre a localização do tumor. Nas 13 categorias da CIF restantes, n=6 estruturas do corpo e n=7 funções do corpo, as mais problemáticas estavam no grupo Cavidade oral/Orofaringe. Das 113 categorias comparadas entre a localização tumoral, apenas 13 foram estatisticamente significativas, e entre elas, a deficiência sempre esteve relacionada com os casos de Cavidade oral/Orofaringe.