

# **AVALIAÇÃO DO GRAU DE DEPENDÊNCIA À NICOTINA DE PACIENTES HIV/AIDS EM ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO (APOIO UNIP)**

**Aluna:** Fabiane Regina Coelho Fontanella Pereira

**Orientador:** Prof. Dr. Elcio Magdalena Giovani

**Curso:** Odontologia

**Campus:** Indianópolis

O propósito deste estudo foi avaliar o diagnóstico das manifestações bucais e sistêmicas que acometem os pacientes HIV tabagistas e avaliar o grau de dependência à nicotina dos mesmos. A pesquisa clínica foi constituída de 15 pacientes atendidos no Centro de Estudos e Atendimento a Pacientes Especiais (CEAPE) e 20 pacientes não sabidamente HIV (grupo controle). Os dados foram coletados durante anamnese, exame clínico, por meio de prontuários, questionários específicos para pacientes tabagistas e questionário de avaliação da dependência da nicotina (Teste de Fagerstöm). No grupo HIV a média de idade foi 45,1  $\pm$ 8,8 anos, no qual 86,7% do gênero masculino e 13,3% feminino. Para o grupo controle a distribuição foi de 40% para o gênero masculino e 60% para o feminino, a média de idade apresentada foi de 40,6  $\pm$ 11,7 anos. As médias dos parâmetros clínicos examinados apresentaram: índice de placa (58,8% para o grupo HIV e 60% para o grupo controle), índice de sangramento (21,5% para o grupo HIV e 38,9% para o grupo controle). Os resultados da análise descritiva demonstram que a presença de doença periodontal parece ser equivalente para ambos os grupos. O teste de Fagerström se mostrou mais elevado no grupo controle quando comparado ao grupo HIV, evidenciando que a maior parte dos pacientes do grupo controle possui grau de dependência à nicotina mais elevado.