

AVALIAÇÃO DA PERCEPÇÃO DOS PACIENTES ENTRE AS TÉCNICAS DE ZUCHELLI E DE MICROCIURGIA PARA O RECOBRIMENTO RADICULAR DE RETRAÇÕES MÚLTIPLAS (APOIO UNIP)

Aluna: Sandy Mitsue Koga

Orientador: Prof. Dr. Márcio Casati

Curso: Odontologia

Campus: Indianópolis

A recessão gengival é caracterizada por um posicionamento apical da margem gengival em relação à junção cimento-esmalte, decorrente da perda de fibras conjuntivas do aparelho de proteção e sustentação do dente e acompanhada de reabsorção da crista óssea alveolar e destruição do tecido cementário, como consequência de um quadro inflamatório presente no tecido conjuntivo gengival. Sua etiologia é complexa, podendo ser causada por injúrias traumáticas (excesso ou inadequada escovação), biofilme dental ou por doença periodontal destrutiva, mau posicionamento dentário, deiscência óssea alveolar, trauma oclusal, tecido marginal delicado e fino recobrimo uma superfície radicular não vascularizada, *piercing* labial, freio e inserção musculares tensionados e fatores iatrogênicos relacionados a tratamentos periodontais, ortodônticos ou protéticos. A decisão pela técnica a ser utilizada requer avaliação cuidadosa de vários parâmetros como: largura e profundidade da recessão; número de recessões; largura da gengiva inserida presente; papila interdental circunjacente e espessura do tecido. Cada técnica pode oferecer um resultado positivo desde que selecionada em circunstâncias corretas. O trabalho aborda um estudo clínico controlado de boca dividida, cego e aleatorizado. Foram selecionados 15 pacientes que tenham retrações múltiplas (mais de 2 dentes), classe I de Miller (1985), bilaterais e que possuam ao menos 2 dentes contralaterais coincidentes acometidos das retrações. Esses pacientes deviam apresentar bom controle de placa (menor que 20%), concordar com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, apresentado a

eles na primeira consulta, não fazer uso de qualquer medicamento que interfira na cicatrização ou na saúde dos tecidos periodontais, não ser fumante e ter profundidade de sondagem \leq a 3mm. O trabalho objetivou mostrar a avaliação dos próprios pacientes sobre os resultados da parte estética, trans e pós-operatória, entre dois tipos de técnicas de recobrimento radicular: Técnica de Zucchelli e Microcirurgia. Os pacientes selecionados e submetidos à cirurgia responderam ao questionário de satisfação; após 6 meses, será realizada a reavaliação e obtenção dos resultados finais.