

PRINCIPAIS CAUSAS QUE LEVAM AO DESMAME PRECOCE DE NUTRIZES DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

Autor: Prof. Lucas Costa Guimarães

A palestra objetiva relatar resultado de pesquisa que visou investigar os fatores que influenciam a prática do aleitamento materno no primeiro ano de vida e comparar a prevalência do aleitamento materno com características maternas.

Trata-se de um estudo transversal realizado com 103 mães de crianças com idade entre 0 e 12 meses. Foi realizada a aplicação de um questionário com 18 questões que abordavam características maternas, da criança e aleitamento materno. Os dados foram analisados no software IBM SPSS Statistics®, versão 22.0 e foi realizada análise descritiva e aplicação dos testes t de student, Kruskal-Wallis e qui-quadrado.

No momento da pesquisa, apenas 35,9% (p 0,05) das crianças com idade igual ou inferior a seis meses de vida estavam em aleitamento exclusivo. A prevalência de desmame entre crianças filhas de mães com renda familiar inferior a R\$ 1.000 foi de 85,7% (p 0,01), empregadas 57,1% (p 0,01) e solteira 57,1% (p 0,01). Quando ao motivo que levou à interrupção do aleitamento materno exclusivo antes do sexto mês de vida ou desmame, 30,2% (p < 0,01) informaram que o leite “secou”. Os dados foram analisados considerando 5% de significância estatística e intervalo de confiança de 95%.