

ÍNDICE DE COMPLICAÇÕES PÓS-OPERATÓRIAS EM PACIENTES SUBMETIDOS À INSTALAÇÃO DE IMPLANTE DENTAL OSSEOINTEGRADO: METANÁLISE (APOIO UNIP)

Aluna: Maria Carolina Rodrigues Leme Biran

Orientador: Prof. Dr. Vinícius Cestari do Amaral

Curso: Odontologia

Campus: Sorocaba

O objetivo deste estudo foi analisar meta-analiticamente o índice de complicações pós-cirúrgicas em pacientes submetidos à instalação de implantes dentais osseointegráveis. Onze estudos relacionados aos índices de complicações foram selecionados para serem analisados. Dentre os estudos, 3 foram relacionados a tabagismo; 8 foram relacionados a diabetes e 8 foram relacionados à peri-implantite. Desta forma, conclui-se que fumantes possuem risco maior de ter complicações nos implantes dentários, o que está diretamente relacionado à quantidade de cigarros fumados ao dia. O diabetes, quando controlado, não possui alto risco de perda de implantes dentários. Como os implantes dentários durante as últimas décadas melhoraram consideravelmente, tanto esteticamente quanto com taxas de implantações bem-sucedidas, peri-implantite continua a ser uma importante causa de falha do implante. Peri-implantite é, em sua grande maioria, uma consequência de outros fatores como diabetes severo ou não controlado, tabagismo e má higiene oral.