

## **INFECÇÃO DO TRATO URINÁRIO (ITU) NA GESTAÇÃO: DEFICIÊNCIAS MÚLTIPLAS X ABORTO (APOIO UNIP)**

**Aluna:** Simone Mendes de Souza

**Orientadora:** Profa. Dra. Dulci N. Fonseca Vagenas

**Curso:** Biomedicina

**Campus:** Alphaville

A Infecção do trato urinário (ITU) é causada por patógenos no sistema renal. A ITU consiste em uma proliferação anormal de bactérias nesta região, podendo ser cistite (região baixa) ou pielonefrite (região alta) e está entre as doenças mais vistas na população. A ITU em gestantes é algo bem comum, pois as alterações anatômicas que acontecem no período da gestação propiciam uma maior facilidade de as bactérias se alojarem e causarem a infecção. Objetivo: O projeto teve como objetivo principal correlacionar a infecção urinária no período da gestação como causa de algumas malformações, aborto ou deficiência no feto. Foi aplicado um questionário, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP-UNIP), em 90 mães de crianças com deficiências múltiplas atendidas na Instituição Rainha da Paz. Resultados: Dessas 90 mães, 33 não tiveram ITU enquanto estavam gestantes; as outras 57 mães responderam que tiveram e fizeram algum tipo de tratamento; 2 mães tiveram aborto enquanto estavam com infecção do trato urinário. Os dados obtidos representam que 63,3% das mães que responderam ao questionário tiveram algum tipo de infecção urinária durante a gestação e 2,2% tiveram entre o terceiro e quarto mês de gestação um aborto espontâneo. Sendo assim, os nossos resultados condizem com a literatura. Conclusão: A alta incidência de ITU em mulheres grávidas necessita de acompanhamento durante toda a gestação, principalmente em casos recorrentes e em condições socioeconômicas desfavoráveis, para minimizar o risco para a saúde das grávidas, evitando malformações e casos de kernicterus nos recém-nascidos.