

AVALIAÇÃO DE QUESTIONÁRIOS SOBRE CHUPETA E DESMAME PRECOCE NO INSTITUTO KARIS E NA CLÍNICA INFANTIL DA FOUNIP – *CAMPUS* INDIANÓPOLIS (APOIO UNIP)

Aluna: Leticia Morais Valério

Orientadora: Profa. Dra. Sucena Matuk Long

Curso: Odontologia

Campus: Indianópolis

Esta pesquisa buscou obter dados sobre desmame e sua associação com o uso de chupetas. **Material e Métodos:** A coleta de dados foi feita no Instituto Karis e na Clínica Infantil da FOUNIP – *Campus* Indianópolis. Foram entrevistadas 30 mães de crianças de 3 a 9 anos e 11 meses, após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa e assinatura do TCLE. **Resultados Parciais:** A maioria das mães (87%) fez acompanhamento pré-natal e todas tiveram acesso a serviços de saúde. O aleitamento ocorreu no dia do nascimento em 77% dos casos. A chupeta foi introduzida por 40% das mães entrevistadas e 92% deram com a intenção de acalmar o bebê. O uso de mamadeira iniciou-se na maternidade (9%), sendo que 10% das crianças ainda usam mamadeira. A idade de desmame, com a introdução de outros alimentos, iniciou-se com 1 mês de vida (3%). **Discussão:** Embora o pré-natal seja recomendado durante a gestação, 10% das entrevistadas não realizaram. A introdução do aleitamento no dia do nascimento é importante para sua manutenção. A introdução da chupeta foi 25% na maternidade e 50% ao chegar a casa. A introdução de mamadeira ocorreu em idades precoces, fato que desencoraja e/ou interrompe o aleitamento materno. **Conclusão:** Pôde-se concluir que a porcentagem de mães que deram chupeta foi menor que a das que não deram. O desmame, com introdução de outros alimentos, iniciou-se em idade precoce (3 meses). Não foi possível relacionar a idade de introdução da chupeta com o desmame precoce.