

# **ESTUDO DA PREVALÊNCIA E CARACTERIZAÇÃO CLÍNICA DAS DERMATOPATIAS ALÉRGICAS DE CÃES ATENDIDOS NO HOSPITAL VETERINÁRIO DA UNIVERSIDADE PAULISTA – UNIP (APOIO UNIP)**

**Aluna:** Rafaela Aoleon Caner de Oliveira Santos

**Orientadora:** Profa. Dra. Patrícia Pereira Costa Chamas

**Curso:** Medicina Veterinária

**Campus:** Indianópolis

A dermatologia é uma área que merece gradativamente maior atenção na clínica veterinária de pequenos animais. Estudos comprovam o crescimento da procura de tutores por médicos veterinários decorrente do aparecimento de lesões de pele, sejam elas de caráter primário ou secundário, em seus animais. Apesar de escassos estudos acerca da dermatologia em território nacional, as dermatites alérgicas se mostraram as dermatopatias mais frequentes em cães e caracterizam-se por inflamação crônica da pele, acompanhada de intenso prurido. As dermatopatias mais comuns em cães incluem a dermatite alérgica à picada de pulgas (DAPP), a dermatite atópica (DA), a hipersensibilidade alimentar (HA) e a dermatite alérgica de contato (DAC), cada uma com suas características particulares em relação a: etiopatogenia, aspectos lesionais, regiões acometidas e dados epidemiológicos. Para diagnosticá-las, apesar de geralmente serem pouco conclusivos, faz-se uso de um conjunto de métodos diagnósticos sendo eles o clínico, o físico e o laboratorial. Para a compilação de dados, foi realizado o levantamento de informações dos casos dermatológicos com exame clínico completo de cães atendidos no hospital veterinário da Universidade Paulista (UNIP) que apresentaram diagnóstico de dermatite alérgica, utilizando-se método retrospectivo de seleção de fichas, ou seja, datadas desde o ano de 2014 até o primeiro semestre do ano de 2019. Como critério de exclusão, foram retiradas da análise todas as fichas cujo diagnóstico referia outras dermatopatias pruriginosas que se encontravam fora do grupo de estudo referido. Após, determinou-se a casuística das diversas

alergopatias e suas respectivas características, com o intuito de auxiliar no aumento de informações acerca das dermatites alérgicas em cães. Observou-se alta prevalência da dermatite alérgica à picada de ectoparasitas, seguido das demais dermatopatias alérgicas. A média de prurido referido pelos tutores obteve nota 9 (prurido intenso). As fêmeas foram mais acometidas que os machos e, dentre as raças, os cães da raça Poodle foram os mais prevalentes dentre os animais afetados.