

ANÁLISE DO NÍVEL DE SATISFAÇÃO DE PACIENTES SUBMETIDOS AO TRATAMENTO COM PROTOCOLO DE BRANEMARK: ESTUDO RETROSPECTIVO EM PACIENTES COM ACOMPANHAMENTO A PARTIR DE CINCO ANOS (APOIO UNIP)

Aluna: Larissa Rosa Santana Rodrigues

Orientador: Prof. Dr. Cláudio Maranhão Pereira

Curso: Odontologia

Campus: Goiânia Flamboyant

Uma das condições bucais mais comuns à população brasileira é o edentulismo, que acomete principalmente os idosos em decorrência de um processo fisiológico de envelhecimento natural. A ausência total ou parcial de dentes implantados nos maxilares resulta em perdas contínuas da qualidade de vida individual, social e profissional. A estética e a função são extremamente deficitárias em perdas totais, resultando na baixa qualidade mastigatória, em problemas de fonação, dificuldade de deglutição, instabilidade emocional em meio social, os quais prejudicam o psicológico do paciente. Nesse âmbito, a presente pesquisa tem como intuito avaliar o nível de satisfação dos pacientes desdentados submetidos ao tratamento com próteses do tipo protocolo de Branemark a partir de cinco anos da sua instalação. Os pacientes serão avaliados de forma clínica e radiográfica a fim de estabelecer parâmetros comparativos em relação a estabilidade, retenção, instalação, integridade estrutural e peri-implantar. A população amostral será constituída de 32 pacientes submetidos ao tratamento com próteses do tipo protocolo de Branemark a partir de 5 anos da sua instalação, ressaltando a suma importância em analisar o nível de satisfação do paciente e qualidade de vida adquiridos após o tratamento. A análise será feita por meio do questionário Schropp e Isidor de 2008 que será aplicado a fim de se determinar o grau de satisfação do paciente em relação às próteses sobre implante. As questões sobre satisfação foram pontuadas em uma escala visual analógica (VAS), em

que a expressão mais negativa é o ponto zero e a mais positiva o ponto dez. Será avaliado tecnicamente o comportamento clínico e radiográfico de tais próteses implanto-suportadas como parâmetro comparativo a fim de evitar viés em caso de tratamentos que não se adequem aos parâmetros de inclusão na pesquisa.