

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS DE COPROFAGIA EM CÃES DA RAÇA SHIH TZU (APOIO UNIP)

Aluna: Amanda de Aguiar Monteiro

Orientadora: Profa. Marcela Sene Rocha

Curso: Medicina Veterinária

Campus: São José dos Campos

O objetivo deste trabalho foi determinar as causas da Coprofagia nos cães da raça Shih Tzu, visando analisar se é um distúrbio comportamental do cão ou se está relacionado a problemas no aparelho digestivo, verminose, anemia. Utilizamos 15 (quinze) cães adultos entre 2 e 4 anos de idade da raça Shih Tzu, os quais possuem a mesma rotina de atividades, a mesma alimentação Premier Raças Pequenas Adulto, mesma fonte de água filtrada. Foi realizada coleta de amostra sanguínea para realização de Hemograma, os quais não apresentaram alterações dignas de nota. Separamos os cães em três grupos de 5 (cinco), denominados Grupo 01, Grupo 02 e Grupo 03, com a finalidade de observá-los pelo período de 2 meses. Observamos que nos Grupos 01 e 02, inicialmente os cães diminuíram a velocidade de ingestão da ração, após um mês separados em grupos, 4 (quatro) cães não estavam mais praticando a coprofagia. Porém, no grupo 03 não houve alteração comportamental, o que diferencia este grupo dos demais é a quantidade inicial de cães não coprofágicos, menor do que nos demais, além de que todos neste grupo se alimentavam demasiadamente rápido. A conclusão é que o meio influencia consideravelmente a prática da coprofagia e, em sua maioria, mostrou ser uma prática comportamental, evidenciada na separação e análise dos grupos. Ainda assim, seria desejável exame Parasitológico de Fezes e de Tripsina Fecal nestes animais que, mesmo após separação dos grupos, apresentaram a coprofagia. Tais exames não foram efetivados nesta pesquisa dadas as dificuldades e restrições causadas pela Pandemia da Covid-19.