

AVALIAÇÃO CORRELACIONAL ENTRE DISBIOSE INTESTINAL E VAGINAL EM MULHERES JOVENS (APOIO UNIP)

Aluna: Mariangela Floriano de Lima

Orientadora: Profa. Dra. Daniela Martins da Silva

Curso: Farmácia

Campus: Santos

A disbiose vaginal é uma doença caracterizada por uma alteração na flora vaginal, decorrente da diminuição das bactérias benéficas ao nosso organismo e do aumento dos germes anaeróbios, ocasionando um dos sintomas mais frequentes: o corrimento vaginal. A microbiota intestinal também é composta por microrganismos que, quando em desequilíbrio, acarretam a disbiose intestinal. O presente estudo teve como objetivo correlacionar os sintomas de disbiose vaginal e intestinal em mulheres jovens. Trata-se de um estudo transversal, observacional, onde 121 mulheres concordaram em participar da pesquisa após prévio esclarecimento sobre o tema, respondendo um questionário de rastreamento metabólico e um questionário ginecológico, apresentado na forma de entrevista semiestruturada com a finalidade de estabelecer uma relação entre os dados e a teoria proposta. Segundo as informações coletadas, foi possível observar alta prevalência de mulheres que relataram sintomas de disbiose intestinal e vaginal. Além disso, o questionário de rastreamento metabólico indicou que a maioria apresentou hipersensibilidade em pelo menos um sistema específico. Não foi possível obter um diagnóstico claro, uma vez que não foram realizadas todas as análises e exames necessários, porém, segundo os resultados, houve alta propensão a disbiose intestinal e vaginal. Com base na análise estatística, de acordo com o teste de Chi-quadrado, houve correlação estatisticamente significativa entre os sintomas das disbioses. Outro resultado encontrado foi a Razão de Chances indicando alta probabilidade de uma mulher que manifeste uma disbiose apresentar outro tipo de disbiose também.