

DIAGNÓSTICO DA INCIDÊNCIA DE MANCHAS BRANCAS NO PÓS-TRATAMENTO ORTODÔNTICO (APOIO UNIP)

Alunas: Pietra Arraval Strotbek e Nataly Canassa de Siqueira

Orientadora: Profa. Ma. Camila C. S. Corassari

Curso: Odontologia

Campus: Alphaville

Manchas brancas são precursoras de lesão de cárie cavitada, caracterizada pela hipomineralização do esmalte, sendo um dos maiores problemas relacionados ao uso de aparelhos ortodônticos fixos. Sua principal causa é o acúmulo de biofilme ao redor do dispositivo colado no dente. Esse fator interfere diretamente na estética do paciente, conseqüentemente elevando a busca pelo tratamento. Há diversos métodos de reabilitação dessa lesão, sendo escolhidas três delas para comparação de eficácia na resolução dos casos. O objetivo deste trabalho é realizar o estudo de caso de incidência, diagnóstico e tratamento de lesão de mancha branca em pacientes selecionados no pós-tratamento ortodôntico. Foram escolhidos três métodos de tratamento para realização deste trabalho: clareamento dental caseiro; microabrasão; infiltração de resina ICON. Os resultados serão avaliados quanto à remineralização e à estética alcançadas.