

**PARÂMETROS CENTRADOS NO PACIENTE APÓS
TRATAMENTO DE MUCOSITE PERI-IMPLANTAR COM
JATEAMENTO SUBGENGIVAL DE PÓ DE ERITRITOL (APOIO
UNIP)**

Alunas: Lívia Rosiello Antunes e Gabriela Resende Carvalho Orofino

Orientadora: Profa. Dra. Mônica Grazieli Corrêa

Curso: Odontologia

Campus: Indianópolis

Este estudo clínico, controlado, randomizado e de boca dividida teve como objetivo avaliar o efeito do tratamento da mucosite peri-implantar com aplicação subgengival de pó de eritritol e clorexidina sobre os parâmetros centrados no paciente. Trinta e seis implantes foram incluídos em cada grupo do estudo: 1 – Grupo teste (n = 36): tratamento da mucosite com jateamento subgengival de pó de eritritol; 2 – Grupo controle (n = 36): tratamento da mucosite com ultrassom e polimento com taça de borracha. A avaliação centrada no paciente (dor e desconforto) foi realizada ao final do tratamento e 24 horas após o procedimento, mensurada por meio da Escala Visual Analógica (EVA). Os resultados mostraram que não houve diferenças entre os grupos para os parâmetros centrados no paciente, em ambos os períodos avaliados ($p > 0,05$). O grupo controle apresentou menores valores de EVA no tempo de 24 horas em comparação ao *baseline* ($p < 0,05$). Conclui-se que ambos os protocolos terapêuticos são bem tolerados pelos pacientes no manejo da mucosite peri-implantar.